

Legenda

Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept
Rp *	Preporučuje se upotreba maksimalno 4-6 nedjelja, nakon tog perioda uraditi ponovnu procjenu terapije
Rp spec a	Ulkusna bolest rezistentna na H2 blokatore, refluksni ezofagitis i Zollinger - Elisonov sindrom, za eradikaciju Helicobacter pylori. Spec.POM do 4 nedjelje, daljnja terapija po preporuci gastroenterologa
Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.
Rp spec 1	Na osnovu dokaza provedenog dijagnostičkim procedurama tj. D.E.X.A.(T-scor<=2,5)
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja
Rp spec**	Samo po preporuci dijabetologa/neurologa ili po preporuci spec.porodične medicine uz strogo provedene testove za dokazivanje polineuropatije.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekomine, postoperativni bolovi).
Rp spec/db	Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom koji se nalaze na intenziviranoj inzulinskoj terapiji samo prema preporuci (nalazu) dijabetologa.
Rp speck/a	Propisuje se samo prema nalazu kardiologa pacijentima nakon IM ili nakon ugradnje stent-a (Bypass-a) u trajanju od 6 mjeseci
Rp spec k	Propisuje se samo po preporuci kardiologa
Rp spec u	Propisuje se samo po preporuci specijaliste urologa
Rp spec o	Po preporuci onkologa
Rp spec d*	Samo po preporuci interniste i/ili propisuju spec.porodične medicine u slučajevima nepodnošenja ACE inhibitora
Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltouracil)
Rp spec p	Po preporuci interniste-pulmologa ili pneumoftiziologa za stanja bronhijalne astme III i IV stupnja gdje postoji neadekvatan terapijski odgovor na inhalirane kortikosteroide ili kratkodjelujuće β -agoniste. U nadležnim PFD-ima su obavezni pisati recepte pneumoftiziolozi.
Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin)
Rp p	Nekomplikirane infekcije urinarnog i respiratornog sistema
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicillin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp spec CMZ	Propisuju specijalisti u centru za mentalno zdravlje tamo gdje su uspostavljeni ili spec.porodične medicine po preporuci NPS-a
Rp spec*1	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja, lijek se ne propisuje pacijentima koji su na hroničnom hemodializnom tretmanu
Rp spec*2	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine, ako primjenom simvastatinu u periodu od 2 mjeseca nije postignuta ciljna vrijednost ukupnog HOLESTEROLA od 4 ili ispod 4, te LDL-a ispod 2,5.

VAŽNA NAPOMENA! Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja polifarmacije kod pacijenata.